

Samenvatting alert

- Er is een beschikbaarheidsprobleem van quetiapine in Nederland en Europa
- De tekorten spelen voornamelijk bij de tabletten met gereguleerde afgifte
- De gereguleerde afgifte tabletten zijn wisselend in beperkte mate beschikbaar
- Vrijstellingsbesluiten voor import van de 50mg, 150mg, 300mg en 400mg tabletten met gereguleerde afgifte zijn reeds verlengd
- Vanwege de beperkte beschikbaarheid is onderstaand behandeladvies van kracht
- Dit advies is geldig t/m 10 april 2026

Algemeen behandeladvies:

- Verzoek om de 50mg mga tabletten **niet** in te zetten voor hogere doseringen door bijvoorbeeld 8 tabletten van 50mg mga tot 400mg mga te combineren.
- Start geen quetiapine bij nieuwe patiënten bij psychose, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornis, autismespectrumstoornis of als additie bij een ernstige unipolaire depressie of obsessief compulsieve stoornis, slaapstoornissen, delier bij patiënten met M. Parkinson of Lewy body dementie.
- Bij patiënten die goed ingesteld zijn op quetiapine: continueer dit of zet – in geval van tekort van de gereguleerde afgifte tabletten – om naar tabletten met gewone afgifte (NB: totale dagdosering evt. verdelen over 2 giften).

Logistiek:

- Lever als apotheek niet meer dan 30 dagen voorraad aan patiënten
- Import van de gereguleerde afgifte tabletten is beperkt mogelijk voor 50mg, 150 mg, 300mg en 400 mg

Switch naar alternatieven:

Slaapstoornissen

- Er zijn voldoende alternatieven bij slaapproblemen (let op de negatieve invloed op de rijvaardigheid):
 - Benzodiazepines (temazepam 10-20 mg (ouderen 10mg) of zolpidem 10mg (ouderen 5 mg));
 - Off-label mirtazapine 3,75 mg-15 mg;
 - Off-label promethazine 25 mg-50 mg (let op bij ouderen vanwege de anticholinerge werking);
 - Off-label trazodon 50-100 mg (let op orthostatische hypotensie).

Psychotische verschijnselen (palliatieve fase) bij ziekte van Parkinson:

- Psychotische verschijnselen (palliatieve fase) bij ziekte van Parkinson: clozapine. Indien dit niet wenselijk is quetiapine reguliere afgifte of rivastigmine.

Apotheken worden dringend verzocht alleen te bestellen voor de meest kritische patiëntengroepen die geen alternatieven hebben en niet meer dan noodzakelijk. Het LCG blijft de voorraden / beschikbaarheid de komende periode monitoren.

Deze alert is mede opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.